## ÖSSZETEVŐK:

Sovány **tej**, **laktóz** (**tej**ből), glükóz szirup, növényi olajok (magas oleasavtartalmú napraforgó-, repce-, napraforgóolaj, közepes láncú trigliceridek (kókusz- és / vagy pálmamagolaj), ligetsutope olaj), **tej**savófehérje, galakto-oligoszacharidok (**tej**ből), vitaminelőkeverék, **tojás**lipid, maltodextrin, nátrium-citrát, fruktó-oligoszacharidok, kalcium-foszfát, **hal**olaj, nátrium-klorid, kalcium-karbonát, Mortierella alpina olaj, L-aszkorbinsav, inozit, kolin-klorid, magnézium-klorid, kálium-citrát, emulgeátorok (**rogás**lectin), DL-alfa tokoferil-acetát, taurin, vas-szulfát, cink-szulfát, nikotinamid, citidin-5'-monofoszfát, L-karnitin, uridin-5'-monofoszfát nátrium só, kalcium-D-pantotenát, inozin-5'-monofoszfát nátrium só, antioxidáns (aszkorbil-palmitát), adenozin-5'-monofoszfát, réz-szulfát, guanozin-5'-monofoszfát nátrium só, retinil-acetát, DL-alfa tokoferol, tiamin-hidroklorid, retinil-palmitát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, pteroil-monoglutaminsav, kálium-jodid, nátrium-szelenit, filomenadion, mangán-szulfát, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin.

**Allergének:** összetevőlistában kiemelve

**Fontos figyelmeztetés!**

- A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej, a legegészségesebb táplálási mód a szoptatás.
- Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van, kérdezd meg a gyermekorvost, védőnőt a tápszer használatáról!
- A termék kizárólag az orvos javaslatára, orvosi ellenőrzés mellett, a használati utasítás szerint alkalmazható. Az orvos előírásától vagy a használati utasítástól eltérő alkalmazása zavart okozhat a csecsemő fejlődésében!

## TÁPANYAGTÁBLÁZAT

**Átlagos értékek 100 ml tápszeroldatban (16,84 g por)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Energia** | **335 kJ** | Tiamin (B1) | 0,14 mg |
| | **80 kcal** | Riboflavin (B2) | 0,2 mg |
| **Zsírok** | **3,9 g** | Niacin (B3) | 2,4 mg |
| amelyből: | | Pantoténsav (B5) | 0,84 mg |
| - telített zsírsav | 1,5 g | B6-vitamin | 0,12 mg |
| - LCP (hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak): | | Folát | 58,3 µg |
| | | B12-vitamin | 0,2 µg |
| -- Arachidonsav (AA) | 20 mg | Biotin | 3,6 µg |
| -- Dokozohexaénsav (DHA) | 20 mg | **Ásványi anyagok** | |
| MCT (közepes láncú trigliceridek) | 0,3 g | Nátrium | 69,6 mg |
| **Szénhidrátok** | **8,4 g** | Kálium | 81 mg |
| amelyből: | | Klorid | 88 mg |
| - cukrok | 5,8 g | Kalcium | 104 mg |
| -- laktóz | 5,09 g | Foszfor | 62 mg |
| inozit | 24 mg | Magnézium | 7,9 mg |
| **Élelmi rost** | **0,6 g** | Vas | 1,6 mg |
| amelyből: | | Cink | 1,1 mg |
| - GOS (Galakto-oligoszacharid) | 0,48 g | Réz | 0,08 mg |
| - FOS (Fruktó-oligoszacharid) | 0,08 g | Mangán | 0,006 mg |
| **Fehérje** (tehéntejből) | **2,7 g** | Fluorid | ≤ 7,2 µg |
| amelyből: | | Szelén | 4,5 µg |
| - tejsavó fehérje | 1,6 g | Króm | ≤ 7,2 µg |
| - kazein | 1,1 g | Molibdén | ≤ 7,2 µg |
| **Só** | **0,17 g** | Jód | 27 µg |
| **Vitaminok** | | | |
| A-vitamin | 366 µg | **Egyéb** | |
| D3-vitamin | 3,1 µg | L-karnitin | 2,1 mg |
| E-vitamin | 4,6 mg TE | Kolin | 26 mg |
| K-vitamin | 6,7 µg | Taurin | 5,5 mg |
| C-vitamin | 18 mg | Nukleotidok | 3,4 mg |

**Fordulj hozzánk bizalommal!**

Ha kérdésed van kisgyermeked táplálásával, fejlődésével, vagy a Milumil® termékek használatával kapcsolatban, bátran hívd munkatársunkat!

06 80 33 12 33 — ingyenes zöldszám

milumil@milumil.hu — www.milumil.hu

NUTRICIA

# Milumil®

# NENATAL

**KORASZÜLÖTT CSECSEMŐK**

diétás ellátására

✓ Magas energiatartalom
✓ Magas fehérje:energia arány
✓ Esszenciális tápanyagok

**Koraszülött formula**

SPECIÁLIS GYÓGYÁSZATI CÉLRA SZÁNT ÉLELMISZER
ORVOSI ELLENŐRZÉS MELLETT HASZNÁLHATÓ

**400 g** e

## FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

**Milumil® Nenatal**

**Standard hígítás: Mellékelt adagolókanál lesimítva ≈ 5,6 g tápszerpor**
**3 lesimított adagolókanál (16,84 g) tápszerpor + 90 ml ivóvíz = 100 ml kész tápszer**

**Adagolási javaslat**

A Milumil® Nenatal napi mennyiségét az életkor és a testsúly figyelembevételével a kezelőorvos állapítja meg.

**A tápszer elkészítése**

1. Moss kezet, forrásban lévő vízben fertőtlenítsd a cumisüveget, a cumit és mindig tiszta adagolókanalat használj.
2. Forrald fel a szükséges mennyiségű ivóvizet, majd hűtsd le kb. 40 °C-ra, és öntsd 1/3 részét a cumisüvegbe.
3. Mérd ki a cumisüvegbe a tápszerport (az adagolási javaslat szerint), zárd le, és rázd jól össze (kb. 20 másodpercig).
4. Öntsd hozzá a maradék vizet, majd óvatosan rázd össze újra.
5. Ellenőrizd a tápszeroldat megfelelő hőmérsékletét (kb. 37°C).

**Gyermeked egészségének érdekében gondosan ügyelj a következőkre:**

- A tápszer 6 hónapos kor előtt egyedüli tápanyagforrásként alkalmazható a kívánt testsúly eléréséig.
- A tápszert minden étkezéshez frissen készítsd el, és 2 órán belül használd fel.
- A melegítéshez ne használj mikrohullámú sütőt, a túlforrósodás veszélye miatt.
- Figyelj arra, hogy babád mindig felnőtt felügyelete mellett igyon, illetve egyen, és etetés után gondoskodj a fogápolásról.
- A Milumil® Nenatal parenterálisan nem adható.

Védőgázos csomagolásban.
Minőségét megőrzi (nap, hónap, év); a doboz alján feltüntetett időpontig.
Tárolás: száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) szorosan visszazárva.
A megbontott dobozt 4 hétnél tovább ne használd!
A termék gyermekektől elzárva tárolandó.

NUTRICIA

## EGYEDI SZAKÉRTELEM

A NUTRICIA tapasztalata a **csecsemőtáplálás** területén már 120 évnél is régebbre nyúlik vissza. Több, mint 500 elkötelezett kutatónk és szakértőnk 40 éve élen jár a kutatásban.

Ez tette lehetővé, hogy létrehozzuk a kifejezetten **koraszülött** csecsemők megnövekedett táplálkozási szükségleteinek fedezésére kifejlesztett **Milumil® Nenatal** termékünket.

**40 — év — kutatás**

**a koraszülött csecsemők táplálásában**

**Milumil® Nenatal, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer**

**Kifejezetten a koraszülött csecsemők tápanyagigényeire kifejlesztve**




✓ Energiában gazdag
✓ Magas fehérje:energia arány
✓ Esszenciális tápanyagok

DANONE

8 712400 779555

Származási hely: EU
Forgalmazó: Numil Kft.
1134 Budapest, Váci út 35.

NL
ZO041
EC

**400 g** e